



распространение болезни!

Главным способом остановить распространение болезни является мытьё рук водой и с мылом.

Если у ребенка наблюдается какой-либо из перечисленных ниже симптомов болезни, обратитесь к врачу и следуйте рекомендациям врача:

- Лихорадка
- Головная боль
- Сильный кашель: у ребенка краснеет или синееет лицо, или он издает пронзительный крупозный или кричащий звук после кашля
- Проблемы с дыханием: это особенно важно для детей младше 6 месяцев
- Необычные пятна на коже или высыпания
- Зараженные участки кожи: твердые, ярко-желтые, сухие или липкие участки кожи
- Необычное поведение: более капризный, менее активный или плачет более, чем обычно. Ребенок в целом чувствует себя некомфортно или плохо себя чувствует
- Серый или белый стул.
- Моча темного или чайного цвета
- Конъюнктивит: слёзы, покраснение век, раздражение с последующим отеком и выделениями
- Боль в горле или проблемы с глотанием
- Рвота
- Потеря аппетита
- Жёлтые или зелёные выделения из носа
- Жёлтая кожа или глаза
- Вши, постельные клопы, чесотка
- Диарея: более одного ненормального жидкого стула. Если у ребенка случился жидкий стул один раз, у него может быть понос. Понаблюдайте за ребенком на предмет наличия жидкого стула или других симптомов. Убедитесь, что ребёнок и лица, осуществляющие уход, моют руки, когда это необходимо.

Позвоните в ИЛР, чтобы отменить посещение на дому, если у вашего ребенка или члена семьи есть какое-либо из перечисленных состояний.

После начала приёма антибиотиков при любом из перечисленных состояний подождите 48 часов до следующего приёма ПИС.

- Персонал может отменить визит при соблюдении вышеуказанных условий.
- Персонал будет соблюдать те же меры предосторожности.
- Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

Программа для младенцев и детей (907) 561-8060

Медсестра общественного здравоохранения (907) 343-4605