



a la propagación de enfermedades!

La principal manera de detener la propagación de enfermedades es lavando sus manos con agua y jabón.

Cuando un niño tenga uno de los síntomas de las siguientes enfermedades, busque y siga el consejo de su médico:

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Tos severa: al niño se le pone la cara roja o azul, o tiene un silbido agudo o jadeo después de toser
- Problemas para respirar: esto es especialmente importante en bebés menores de 6 meses
- Manchas o sarpullidos inusuales
- Pedazos de piel infectados: con costra, amarillo brillante, áreas de piel secas o pegajosas
- Comportamiento inusual: más irritable, menos activo o llora más de lo normal. El niño parece estar incómodo o no se ve bien en general
- Heces grises o blancas
- Orina oscura o de color similar al té
- Conjuntivitis: lagrimeo, enrojecimiento de las orillas de los párpados, irritación, seguida de inflamación y secreción
- Garganta irritada y problemas para tragar
- Vómito
- Pérdida del apetito
- Secreción amarilla o verde de la nariz
- Piel u ojos amarillos
- Piojos, chinches o sarna
- Diarrea: más de una deposición anormalmente blanda. Si un niño tiene solo una deposición blanda, podría tener diarrea. Observe al niño en caso de que tenga más deposiciones blandas u otros síntomas. Asegúrese de que el niño y el cuidador se laven las manos en todos los momentos que sean recomendables.

Llame a ILP para cancelar su visita a casa si su hijo o un miembro de su familia tiene cualquiera de las condiciones que se listan.

Deje que pasen 48 horas después de que se inicien los antibióticos para cualquiera de las condiciones que se listan, antes de su próxima visita con PIC.

- El personal puede cancelar una visita si se observa cualquiera de las condiciones mencionadas.
- El personal seguirá las mismas precauciones.
- Para más información llame a:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Programs for Infants and Children | (907) 561-8060 |
| Public Health Nurse | (907) 343-4605 |